

Rehydrat® Tabs

agilan® Ergänzungsfuttermittel

Zur Unterstützung der Verdauung

Leicht löslich, sprudelnd, reich an Energie und Elektrolyten

Für Kälber, Ferkel und Geflügel

Zusammensetzung

Lactose; Natriumbicarbonat; Natriumchlorid; Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile

Rohprotein	5,5 %
Rohfett	1,8 %
Rohfaser	0,5 %
Rohasche	17,9 %
Natrium	6,5 %
Kalium	1,2 %
Chlorid	4,3 %
Lysin	0,0 %
Methionin	0,0 %

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

<u>Konservierungsmittel:</u>	Zitronensäure (E330)	80.000 mg
<u>Vitamine:</u>	Vitamin C (3a300)	10.000 mg

Einsatzempfehlung

Zur oralen Rehydratation bei *Kälbern*, *Ferkeln* und *Geflügel*.

Rehydrat® Tabs gleichen Elektrolyt- und Körperwasserverluste durch eine adäquate Mineralstoffzusammensetzung und den Energiemangel durch die energiereiche Lactose schnell und zuverlässig aus.

Fütterungsempfehlung

Kälber: 1 Tab/ Liter handwarmes Wasser

sollte zusätzlich zu den üblichen Milchmahlzeiten als 1–3 Zwischenmahlzeiten pro Tag in einer der Schwere der Fälle entsprechenden Tagesmenge zur selbständigen Aufnahme angeboten werden. Die Rehydrat® Lösung sollte über die gesamte Dauer einer veränderten Kotkonsistenz eingesetzt werden.

Kotkonsistenz	Zusätzlicher Flüssigkeitsbedarf (in % des KGW)	40 kg Kalb	
		pro Tag	Tränkungen
Dünn breiig	ca. 5 %	2 l	2 l / 1 x tägl.
Suppig	ca. 10 %	4 l	2 l / 2 x tägl.
Wässrig	15 (-20) %	6 (-8 l)	2 l / 3 x tägl.

Ferkel: 1 Tab/ Liter handwarmes Wasser

Die Rehydrat® Lösung wird den Ferkeln zur freien Aufnahme angeboten. Am besten dazu die Lösung mehrmals pro Tag frisch ansetzen. Dies erhält die Neugier der Ferkel und verhindert Geruchsannahme aus der Umgebung.

Geflügel: 1 Tab/100 Liter Trinkwasser auflösen.



Rehydrat® Tabs

Fütterungshinweis

Die Lösung sollte vor jeder Anwendung mit sauberem Wasser frisch hergestellt werden. Rehydrat® Tabs sollten in zeitlichem Abstand zur Vollmilch- / Milchaustauscher - Ration gegeben werden.

Lactose verleiht Rehydrat® Tabs eine sehr hohe Energiedichte bei geringer Osmolarität. Lactose erhält die Lactaseaktivität, so dass problemlos zur Milchfütterung zurückgekehrt werden kann.

Dieses Produkt dient für Kälber und Ferkel nicht als Alleintränke.

Empfohlene Fütterungsdauer: 1 - 7 Tage

Bei Gefahr vor, während oder nach Verdauungsstörungen.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Stand: Februar 2019