

Vitamin A

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Futtermischbar

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Gehalt an Vitamin A

Zusammensetzung

Weizengrießkleie, Traubenzucker

Analytische Bestandteile

Rohprotein	15,70 %
Rohfett	4,60 %
Rohfaser	11,80 %
Rohasche	6,10 %
Lysin	0,70 %
Methionin	0,20 %
Natrium	0,05 %

Empfohlene Fütterungsdauer

Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit

Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung

Weibliches Geflügel: während des Östrus

Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Einsatzempfehlung

Essentiell für Wachstum und Epithelschutz.

Bei besonderen Leistungsanforderungen zur Unterstützung der körpereigenen Immunabwehr. Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung.

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine:

Vitamin A (3a672a) 4.500.000 I.E.

Fütterungsempfehlung

Schweine und Geflügel: 1 kg / t Alleinfutter

Wiederkäuer: 2 - 3 g je 100 kg KGW und Tag

Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Vitamin A in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehaltes in Alleinfuttermitteln enthalten. Wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Vitamin A darf dieses Diätergänzungsfuttermittel an Zuchttiere nur bis 0,1% der Tagesration verfüttert werden. **Vor Verwendung des Futtermittels oder von Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: März 2022

6871/K/03/22

